

**Листок-вкладыш: Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата для пациента**

**Диоспей, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 450/50 мг**

**Диосмин+Гесперидин**

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Диоспей, и для чего его применяют.
2. О чём Вам следует знать перед приемом препарата Диоспей.
3. Прием препарата Диоспей.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Диоспей.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Диоспей и для чего его применяют**

Фармакотерапевтическая группа: Ангиопротекторы. Препараты, снижающие проницаемость капилляров. Биофлавоноиды. Диосмин в комбинации с другими препаратами

Код ATX C05CA53

**Показания к применению**

2. Симптоматическое лечение венозно-лимфатической недостаточности (тяжесть в ногах, боль,очные судороги)
3. функциональные симптомы, связанные с острыми приступами геморроя.

## **2. О чем следует знать перед приемом препарата Диоспей**

### **2.1 Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- период лактации

### **2.2 Особые указания и меры предосторожности**

Перед приемом препарата Диоспей проконсультируйтесь с лечащим врачом. При острых приступах геморроя применение препарата Диоспей не заменяет специфического лечения других заболеваний аноректальной области. Препарат назначают коротким курсом. При неэффективности проведенного лечения следует провести дополнительное обследование и коррекция терапии. При назначении препарата пациентам с нарушениями венозного кровообращения следует проинформировать их о необходимости предохранения от длительного пребывания на солнце, длительного стояния на ногах, снижения массы тела и ношения специальных чулок, улучшающих циркуляцию крови.

### **2.3.Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

2.3.1 Так как данные отсутствуют, рекомендуется сообщить лечащему врачу о том, что Вы принимали, принимаете или планируете принимать какие-либо другие препараты вместе с Диоспей.

### **2.4.Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

#### **2.4.1 Беременность и грудное вскармливание**

В экспериментальных исследованиях тератогенного эффекта не выявлено.

До настоящего времени о каких-либо побочных эффектах при применении препарата у беременных не сообщалось.

В связи с отсутствием данных об экскреции препарата в грудное молоко, применение препарата в период лактации не рекомендуется.

## **2.5. Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами**

Диоспей не влияет на способность управлять автотранспортом и потенциально опасными механизмами.

### **3. Прием препарата Диоспей**

#### **3.1 Доза**

##### **Способ применения и дозы**

Рекомендуемая доза составляет 2 таблетки в день, 1 таблетка в середине дня и 1 таблетка вечером во время приема пищи.

При остром приступе геморроя: 6 таблеток в день в первые 4 дня (по 2 таблетки 3 раза в день), затем – по 4 таблетки в последующие 3 дня (по 2 таблетки 2 раза в день).

Длительность курса лечения определяется лечащим врачом.

#### **3.2**

##### **Дети**

Показаний по применению препарата Диоспей 450мг/50мг у детей нет.

#### **3.3 Путь и способ введения**

Препарат предназначен для приема внутрь. Таблетки можно принимать вместе с пищей.

Запивать большим количеством воды.

#### **3.4. Если Вы приняли препарата больше, чем следовало**

Если Вы приняли препарата больше, чем следовало, об этом следует сообщить врачу.

*Симптомы:* усиление побочных эффектов

*Лечение:* симптоматическое

## **4. Возможные нежелательные реакции.**

### **4.1 Описание нежелательных реакций**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Эти эффекты обычно имеют слабо-выраженные или умеренный характер.

**Если Вы испытываете любой из следующих нежелательных реакций, прекратите использование лекарства и немедленно обратитесь за медицинской помощью:**

В разделе перечислены выявленные побочные реакции с учетом частоты их встречаемости: очень часто ( $\geq 1/10$ ); часто ( $\geq 1/100$  до  $<1/10$ ); нечасто ( $\geq 1/1000$  до  $<1/100$ ); редко ( $\geq 1/10000$  до  $<1/1000$ ); очень редко ( $<1/10000$ ); не известно (частота не может быть оценена по имеющимся данным).

*Часто:*

- желудочно-кишечный дискомфорт, боли в эпигастринии, тошнота.

*Нечасто:*

- сонливость, головная боль, головокружение
- боль в животе, диспепсия, рвота, диарея,
- сыпь, зуд, крапивница
- гипотония, спазмы, сердцебиение
- утомляемость, бессонница тревожность.

*Редко:*

- носовое кровотечение, маточное кровотечение в период менструации

### **4.2 Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории Республика Армения. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

## **5. Хранение препарата Диоспей.**

Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок хранения**

3 года

Не применять после истечения срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

## **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

Препарат Диоспей содержит

Одна таблетка содержит

*активные вещества:* очищенная микронизированная флавоноидная фракция, состоящая из диосмина 450 мг и гес перидина 50 м г,

*вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, желатин, натрия крахмала гликолят тип А, тальк, магния стеарат,

*состав оболочки:* воск пчелиный белый, глицерол, гипромеллоза 2910, макрогол 6000, натрия лаурилсульфат, железа оксид желтый Е172, железа оксид красный Е172, титана диоксид Е171, магния стеарат.

### **Внешний вид препарата Диоспей и содержимое упаковки**

Таблетки овальной формы, с двояковыпуклой поверхностью и риской, покрыты пленочной оболочкой розово-бежевого цвета.

По 15 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 2 контурные упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

**Производитель**

Help S.A.,

Педини Иоаннион, 45500, Иоаннина, Греция

**Держатель регистрационного удостоверения**

SPEY MEDICAL LTD,

Линтон Хаус 7-12 площадь Тависток, WC1H 9LT, Лондон, Великобритания

*За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:*

ТОО «CEPHEUS Medical» (Цефей Медикал): 050045, Республика Казахстан, г. Алматы,

Проспект Аль-Фараби, дом 7, ЖК «НурлыТай», блок 5А, офис 247,

телефон: +7 (727) 978 6971, +77771750099 (круглосуточно)

e-mail: [drugsafety@evolet.co.uk](mailto:drugsafety@evolet.co.uk)