

ЛАКТОСПЕЙ БУЛАРДИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Торговое название: Лактоспей Буларди.

Международное непатентованное название: нет.

Лекарственная форма: капсулы для приема внутрь.

Состав: каждая капсула содержит:

Активные вещества:

250 мг – Сахаромицеты Буларди (Lynside Pro SCB PW) не менее 5,0 × 10⁹ КОЕ в капсуле на момент производства.

125 мг – Смесь пробиотиков ENT-1 (лактобактерии ацидофильные, лактобактерии казеи, бифидобактерии бифидум) – не менее 1,0 × 10⁹ CFU в капсуле на момент производства.

25 мг – Инулин (пребиотик)

Вспомогательные вещества:

5 мг – магния стеарат

95 мг – пустая капсула из растительных источников (корпус: белый, колпачок: белый)

Фармакотерапевтическая группа: Противодиарейные препараты, содержащие микроорганизмы.

Код АТХ: A07FA.

Фармакологическое действие:

Лактоспей Буларди помогает в снижении тяжести и длительности острой инфекционной диареи и колита у взрослых и детей. Продукт содержит

Сахаромицеты Буларди – полезные микроорганизмы, которые помогают снять симптомы острой и хронической диареи. Сахаромицеты Буларди обладает антитоксинным действием в отношении бактериальных цито- и энтеротоксинов, повышает ферментативную функцию кишечника. Сахаромицеты Буларди обладает естественной устойчивостью к антибиотикам, поэтому препарат можно принимать наряду с сильными антибиотиками.

Лактоспей Буларди также содержит молочнокислые микроорганизмы, которые после приема поддерживают нормальную микрофлору кишечника, а также восстанавливают нарушенный баланс. Лактобактерии ацидофильные – эффективно колонизируют места нахождения болезнетворных бактерий, не давая им развиваться; быстро восстанавливают нарушенный баланс микрофлоры кишечника после применения антибиотиков.

Бифидобактерии бифидум – наиболее эффективно подкисляет содержимое желудочно-кишечного тракта, что ингибирует развитие болезнетворных бактерий, стимулирует работу кишечника, участвует в регуляции холестерина и липидов.

Инулин в составе препарата оказывает выраженное действие на кишечник, благотворно влияя на его деятельность и способствуя размножению полезных бифидобактерий.

Показания к применению:

- лечение и профилактика диареи любой этиологии;
- диарея путешественников;
- профилактика диареи и дисбактериоза;
- дисбактериоз;
- синдром раздраженного кишечника;
- колит, вызванный клостридиями и псевдомембранозный колит.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость компонентов препарата;
- наличие центрального венозного катетера, так как описаны редкие случаи возникновения фунгемии у больных с центральным венозным катетером в госпитальных условиях.

Побочный эффект:

Нет данных о побочных эффектах.

Способ применения и дозы:

Внутрь.

Взрослым и детям старше 6 лет: по 1-2 капсуле в день.

Детям младше 6 лет: по 1 капсуле в день.

Капсулы принимают внутрь, запивая небольшим количеством воды.

Детям содержимое капсулы растворить в воде или в соке.

Прием препарата для лечения острой диареи в обязательном порядке должен сопровождаться регидратацией.

Особые указания:

Не следует превышать указанную дозу.

Не использовать по истечении срока годности указанной на упаковке.

Не рекомендуется пациентам с непереносимостью лактозы, а также беременным и кормящим женщинам.

Форма выпуска:

10 капсул в баночке. Одна баночка вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30°C.

Срок годности: 2 года.

Владелец Торговой Марки:
SPEY MEDICAL Ltd.
London, United Kingdom

Производитель:
Kendy Ltd.
Bulgaria